

DRZEWA W STANIE BEZLISTNYM – PARK SZCZYTNIKI

1. **Tulipanowiec amerykański** – charakterystyczny spłaszczony pąk szczytowy.
2. **Grab pospolity** – charakterystyczna kora ze smugami, na pąkach zielonkawa siateczka.
3. **Dąb błotny** – mniejsze konary charakterystycznie zwisają w dół, często na drzewie zimą zostają suche liście, klapy liści ułożone pod kątem 90 st. (np. dąb szkarłatny ma klapy w kształcie C).
4. **Leszczyna pospolita** – żółte kotki.
 - **Leszczyna w odm. 'Fuscorubra'** – czerwone kotki, czerwone liście zmienne w porach roku, bardzo cenne do kompozycji.
5. **Magnolia drzewiasta** – na pąkach widoczny kontrast, pąki mniejsze niż np. u magnolii gwiaździstej i pośredniej.
6. **Orzesznik siedmiolistkowy** – pędy lekko omszone, dwa spiczaste pąki szczytowe, trudny do oznaczenia w stanie bezlistnym, kora u góry łuszczy się mniej niż u orzesznika pięciolistkowego.
7. **Oczar wirginijski** – skrętoległe pąki osadzone na trzonku, bez łusek, kolor pędu i łusek ten sam, jasny; kwitnie w październiku.
8. **Skrzydłorzech kaukaski** – brak łusek na pąkach.
9. **Orzech szary** – bardzo głębokie bruzdy, wyczuwalny pasek zamszu nad blizną liściową na pędzie, owoce głęboko spękane – charakterystyczne.
10. **Buk pospolity** – charakterystyczne owocostany i wrzecionowate pąki.
11. **Kłęk amerykański** – charakterystyczne duże owocostany, trujący dla ryb – nie sadzić w pobliżu oczka wodnego, cała roślina trująca.
12. **Złotokap** – omszony pęd, zielony.
13. **Parocja perska** – łuszczy się trochę jak u platana, pędy podobny do oczaru ale parocja ma ciemny pęd a oczar jasny.
14. **Lipa krymska** – charakterystyczna cecha – konary opadają łukowato w dół, u nasady owocostanu ciemniejsze włoski, pęd z góry czerwony a spodem zielony.
15. **Lipa drobnolistna** – bardzo drobne owoce, wywijają się do góry a nie zwisają do dołu.
16. **Surmia żółtokwiatowa** – głębokie żłobienia w korze, wąskie torebki owocostanów.
17. **Surmia bignoniowa** – zupełnie inna kora niż u surmii żółtokwiatowej, grubsze owocostany.
18. **Halezja karolińska** – w formie krzewu lub drzewa (odm. górską), częściej krzew niż drzewo, charakterystyczne owoce, pęd omszony, kora na drzewie mozaikowo spękana.
19. **Strączyn żółty** – bardzo gładka kora, porównywalnie gładka jak u buka, kolor zielony.
20. **Klon Lobela** – liście małe, podobne do klona polnego, charakterystyczny pokrój i kora.
21. **Orzesznik pięciolistkowy** – łuszcząca się kora, charakterystycznie odstaje.
22. **Orzesznik gorzki** – charakterystyczne musztardowe pąki i pędy.
23. **Skrzydłorzech kaukaski** – charakterystycznie zwisające owoce.
24. **Ambrowiec balsamiczny** – charakterystyczna kora oraz owoce z wypustkami.
25. **Wiąz polny** – skrętoległe ułożenie pąków, inne niż u klona, pąki błyszczące.
26. **Wiązowiec zachodni** – pąki przylegają do pędu, pęd zygzakowaty.

27. **Kasztan jadalny** – bardzo kanciasty pęd, suche liście zostają na drzewie, struktura suchych liści podobnie jak u buka.
28. **Klon francuski** – liście bardzo małe, 3 klapowe, podobne do klonu polnego, pączki bardzo długie, wrzecionowate, pęd z przetchlinkami, pięknie przebarwia się na żółto jesienią.
29. **Klon kapadocki** – pączki i pędy w tym samym kolorze, na końcach łusek brązowe czubeczki, liście drobne, bez ząbków.
30. **Strączyn żółty** – pąk schowany w środku liścioślada, pąk silnie omszony.
31. **Dąb biały** odm. łyżeczkowata.
32. **Dąb kaukaski** – liść od spodu bardzo miękki w dotyku, pąki przylegają do pędu i są omszone.
33. **Dąb burgundzki** – frędzelki przy pąkach bardziej wystające i widoczne niż u dębu kaukaskiego, inne owocostany – czapeczka z kolczastymi wyrostkami.